

1953г.  
Проф. А. Ф. ФЛЁРОВ

## КРАТКИЙ ОЧЕРК РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ КОММУНЫ „СВЕТЛЫЙ ПУТЬ ЛЕНИНА“ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

(ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ 1934 г.)

### ГЛАВА I

### РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Земельные угодья коммуны „Светлый путь Ленина“ располагаются на двух массивах. Один массив — результат процессов горообразования отрогов Кавказских хребтов и продуктов сопочных выносов. Другой массив — дельтовые наносы р. Кубани и переработанные морем отложения этих наносов. На стыке этих двух массивов находятся отложения результатов морских и аллювиальных речных намывов и элювиальных и делювиальных отложений.

В соответствии с этим по растительному покрову можно резко различить 2 типа растительных группировок: предгорно сопочная и дельтовая. Между ними — узкая полоса переходного типа, находившаяся длительное время в культуре и поэтому лишенная основной типичной растительности. По крайней мере восстановить типичную группировку первичной растительности этой полосы не удалось, за отсутствием растительных индикаторов. Можно полагать, что здесь имела переходная группировка от степной к лугово-болотной группе. Вряд ли можно эту неустойчивую растительную группировку связать с каким-нибудь определенным типом почв. Такая растительность лугово болотно-степного состава могла образовать лугово-степные, луговые и лугово-болотные почвы.

Выявление характера и типов возвышенной предгорной части представило большие затруднения, так как вся эта площадь находится в длительной культуре. Поэтому характеристику растительности этого массива можно было установить лишь по остаткам растительности по непахотям, по омежьям и балочным обрывам. Только часть массива, сбегаящего к долине р. Кубани и представляющего из себя продукты сопочных выносов и отложений, в отношении растительного состава удалось изучить детально, так как в силу развития здесь солонцев (до 70% площади), эта площадь под пахотой никогда не была и использовалась лишь как выпас.

#### А. Характер растительности предгорной части массива

На предгорном, возвышенном массиве удалось выявить, что основным типом Темрюкской группировки растительности, в полном

Проф. А. Ф. ФЛЁРОВ

## КРАТКИЙ ОЧЕРК РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ КОММУНЫ „СВЕТЛЫЙ ПУТЬ ЛЕНИНА“ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

(ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ 1934 г.)

### ГЛАВА I

#### РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Земельные угодья коммуны „Светлый путь Ленина“ располагаются на двух массивах. Один массив — результат процессов горообразования отрогов Кавказских хребтов и продуктов сопочных выносов. Другой массив — дельтовые наносы р. Кубани и переработанные морем отложения этих наносов. На стыке этих двух массивов находятся отложения результатов морских и аллювиальных речных намывов и элювиальных и делювиальных отложений.

В соответствии с этим по растительному покрову можно резко различить 2 типа растительных группировок: предгорно сопочная и дельтовая. Между ними — узкая полоса переходного типа, находившаяся длительное время в культуре и поэтому лишенная основной типичной растительности. По крайней мере восстановить типичную группировку первичной растительности этой полосы не удалось, за отсутствием растительных индикаторов. Можно полагать, что здесь имелась переходная группировка от степной к лугово-болотной группе. Вряд ли можно эту неустойчивую растительную группировку связать с каким-нибудь определенным типом почв. Такая растительность лугово-болотно-степного состава могла образовать лугово-степные, луговые и лугово-болотные почвы.

Выявление характера и типов возвышенной предгорной части представило большие затруднения, так как вся эта площадь находится в длительной культуре. Поэтому характеристику растительности этого массива можно было установить лишь по остаткам растительности по пахотям, по омежьям и балочным обрывам. Только часть массива, сбегаящего к долине р. Кубани и представляющего из себя продукты сопочных выносов и отложений, в отношении растительного состава удалось изучить детально, так как в силу развития здесь солонцев (до 70% площади), эта площадь под пахотой никогда не была и использовалась лишь как выпас.

#### А. Характер растительности предгорной части массива

На предгорном, возвышенном массиве удалось выявить, что основным типом Темрюкской группировки растительности, в полном